

ОБЕСПЕЧИМ СВОЕВРЕМЕННУЮ УБОРКУ И ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

По постановлению Совнаркома СССР в 150 колхозах Чкаловской области ныне должны быть восстановлены нарушенные за годы войны травопольные севообороты и в 500 колхозах введены вновь.

Травосеяние в рамках травопольного севооборота и залужение культурными травами залежей, выгонов и сенокосов является единственным, наиболее надежным средством подема нашего хозяйства.

Одним из основных факторов, тормозящих травосеяние в колхозах нашей области, является недостаток семян кормовых трав — люцерны, житняка, коостра. В Чкаловском районе, например, в текущем году из-за недостатка семян колхозы посеяли в среднем только по 10 гектаров многолетних трав, а всего по району 300 гектаров, т. е. столько, сколько должен засеять один колхоз.

Семеноводство кормовых трав с успехом может и должно быть налажено в каждом колхозе и совхозе. Между тем, многие хозяйства совсем не выращивают у себя семена трав, или выращивают только люцерну, забывая житняк, как наиболее выгодную и приспособленную к местным полусухим условиям траву. Совершенно забыт коостер, это прекрасное кормовое растение для луговых угодий и выгонов в более увлажненной части области. Нередко семенники трав остаются без всякого ухода или скашиваются на сено.

Коренной перелом в создании достаточных семенных фондов трав, а значит и в освоении севооборотов, мы можем и должны сделать уже в текущем году с тем, чтобы, как указано в решении правительства, в ближайшие 2—3 года обеспечить поля, подлежащие засеву травами, собственными семенами. Для этого надо в максимальной степени использовать имеющиеся посевы люцерны, житняка и коостра для сбора семян.

Площадь семенников люцерны в колхозах области равна 20.000 гектарам, в совхозах — 4984 гектарам.

Посевы житняка у нас еще больше: в колхозах — 29 тыс.; в совхозах — 48 тысяч гектаров.

Для семенных целей нужно широко использовать также все цветущие фуражные участки люцерны, как в первом, так и во втором укосах.

При неустойчивых урожаях семян лю-

церны, в степной полосе, в благоприятные годы нужно ориентироваться на житняк, как на основную культуру в деле введения и освоения севооборотов. Житняк почти не знает недородов семян. Даже в плохие годы он дает по крайней мере 50—100 килограммов семян с гектара. В нынешнем году ожидается 2,5—3 центнера с гектара. Житняк не боится наших зимних морозов, не требователен к почве, устойчив против засухи и вредителей, не требует сложной агротехники. При своевременном посеве он удаётся на сорных землях, так как способен подавлять сорняки.

Ценность житняка возрастает в связи с тем, что он дает нормальный урожай при стерневом посеве, без предварительной обработки почвы. Посев житняка по стерне может и должен найти самое широкое применение в каждом хозяйстве засушливой полосы.

В текущем году для уборки на семена в колхозах области оставлено 20.000 гектаров житняка, в совхозах — 19.000 га. Кроме того, совхозы в порядке помощи выделяют 3800 га. семенников колхозам. Это очень хорошая помощь. Но желательно было бы ее расширить. Следовало бы вообще продумать вопрос о дополнительном выделении площадей житняка для семенных целей, пока он еще не весь скошен на сено.

Принимая во внимание ожидающийся высокий урожай семян житняка, это было бы вполне целесообразно, особенно в тех хозяйствах, где план сенокосения может быть выполнен на естественных сенокосах.

Кроме того, нужно широко практиковать сбор дикорастущего житняка и коостра. Следует учесть, что житняк в настоящем году созреет раньше, чем яровые хлеба, что значительно облегчит уборку его на семена.

Семенные участки необходимо содержать чистыми от сорняков. Широкоярдные посевы люцерны очищаются от сорняков при помощи 2—3-кратной междурядной обработки с прополкой в рядках. На сплошных посевах трав сорняки удаляются вручную. С особой тщательностью семенники нужно очистить от карантинных сорняков; семена которых трудно отделить от семян трав — как например, донник, просьянка, полынь и другие.

Семена трав при созревании подверже-

ны сильному осыпанию. Поэтому только один день запоздания с уборкой влечет за собой часто огромные потери — до 50—70 проц. семян. Самое главное, поэтому, в уборке семенников трав — не допустить перестоя на корню. Уборку люцерны лобогрейками или жатками рекомендуется проводить при побурении около 75 проц. бобиков, комбайнами — при побурении около 90 проц. Житняк простыми машинами убирается с начала восковой спелости, комбайнами — при переходе из восковой спелости в полную.

Комбайны при уборке трав подвергаются некоторому специальному переоборудованию согласно имеющимся инструкциям. Простые машины снабжаются крепкими зерноуловителями. Во избежание потерь уборку нужно проводить по утрам, вечером и в пасмурные дни.

Из валков люцерны сейчас же после скашивания нужно делать небольшие кучки по 1—2 валка и тщательно оправлять, чтобы убирать их с поля вилами в один прием, как снопы, без подгребания. Этим мы избавляемся от тех больших потерь, какие имеют место без оправки валков или при складывании их в большие копны.

Житняк вслед за скашиванием складывается в крупные копны по 9—11 валков, где семена его дозревают, а солома сохраняет зеленый цвет. В сухую погоду люцерну через 2—3 дня, а житняк через 6—7 дней увозить с поля, подстилая на фургоны солому, и немедленно молотить, чтобы не подвергать скирды промачиванию дождями и избежать порчи семян.

Семена коостра и житняка необходимо сразу подготовить к посеву и проверить на всхожесть. Лучше всего эти травы удаются при посеве в осеннее время. Это обстоятельство нельзя не учитывать, если мы хотим действительно создать для животноводства прочную кормовую базу и навести порядок в землепользовании.

М. КУЗНЕЦОВ.

Ст. научный сотрудник научно-исследовательского института молочно-мясного скотоводства.

Ответственный редактор

М. И. РЯБОВ.